



CALIBRACHOA

Plantacote® plus

EFFECT

WUXAL®

Nawożenie podstawowe

Calibrachoa na początku wymaga luźnego dobrze przepuszczającego podłoża najlepiej o pH: 5,3-5,5. Substrat powinien być wymieszany z Perlitem oraz wzbogacony o chelat żelaza. Sadzimy do doniczek od połowy grudnia do połowy marca w ziemię o pH: 5,8-6,2. Doniczki powinny stać najlepiej na matach podsiąkowych. Zalecane sadzenie w doniczki 8-12 cm, ample, skrzynki balkonowe. Nadaje się również jako jednoroczna płożąca roślina rabatowa.

Dokarmianie w trakcie wegetacji (fertygacji):

WAZNE! Nawozimy przy każdym podlewaniu. Stosunek NPK: 3-1-1,5 przy stężeniu 0,1-0,15%. Na 25 kg nawozu dodatkowo dodajemy ok. 120 g chelatu żelaza.

Aby uzyskać stężenie około **0,1% na 1000 l** pożywki gotowej należy wymieszać:

- Effect 16-16-18 0,5 kg
- Saletra potasowa 0,5 kg

Prosimy nie zapominać o chelacie żelaza gdyż Calibrachoa jest bardzo wrażliwa na jego brak.

Ogólne: Wystarczy tylko jedno uszczykiwanie. Wymagana temperatura w czasie ukorzenia to 20°C. W trakcie wzrostu gdy sadzonka już się ukorzeni, temperaturę obniżamy do 10-12°C. Aby skrócić okres wzrostu zalecamy wydłużenie dnia od początku lutego do 13 godz. Calibrachoa nie lubi cienia bo powoduje to opóźnienie wzrostu i kwitnienia.

Skarlanie: Pierwszy raz skarlamy B9 w stężeniu 0,2-0,3%, później stosujemy Bonzi w stężeniu 0,15-0,3% aż do końca lutego. W trakcie podlewania z tymi środkami trzeba zwrócić uwagę aby substrat nie był przesuszony. Zaleca się częstsze stosowanie preparatów ale o obniżonej koncentracji dla lepszego efektu.

Ważne: W niskiej temperaturze preparaty działają intensywniej. Prosimy zacząć stosowanie dość wcześnie.

Podlewanie: Istotne aby podlewać równomiernie i bardzo regularnie. Nie wolno dopuszczać do dużego przesuszenia podłoża ani do zbyt dużej wilgotności. Wystrzegać się wieczornego podlewania. (Wilgoć wzmaga choroby grzybowe).